

**Información de Riesgo 2012**  
**Preguntas Frecuentes: Meningitis en el Condado de Crook**  
**(actualizado el 19 de marzo de 2012)**

**¿Qué es lo que está pasando?** Prineville está experimentando un brote de enfermedad meningocócica. Esto ha llevado a una recomendación ampliada para que la vacuna meningocócica incluya a personas de 9 meses a 25 años de edad que viven, trabajan, asisten a la escuela o guardería en el área de Prineville.

**¿Qué es la enfermedad meningocócica?** El meningococo es una enfermedad muy rara causada por una bacteria que a veces puede provocar una enfermedad grave. En casos raros, las complicaciones de la enfermedad meningocócica pueden incluir daño cerebral, sordera, parálisis y pérdida de dedos o extremidades. Alrededor del 10 por ciento de los casos son fatales.

**¿Es fácil contagiarse la enfermedad meningocócica?** No. La enfermedad meningocócica no es fácilmente transmisible. Es una enfermedad muy rara, que generalmente afecta a menos de 1 persona de cada 100,000 por año.

**¿Quién contrae la enfermedad meningocócica?** La enfermedad afecta principalmente a adolescentes y adultos jóvenes. En Prineville durante el último año, la mayoría de los seis casos han sido personas menores de 25 años.

**¿Qué puedo hacer para protegerme contra la enfermedad meningocócica?** La mejor manera de prevenir la enfermedad meningocócica es mediante la vacunación. Otra forma de reducir el riesgo de infección es lavándose las manos, no fumando y no compartiendo cigarrillos ni utensilios para la comida y bebidas.

**¿Cuál es el peligro de fumar?** Fumar o estar expuesto al humo del cigarrillo de otras personas parece aumentar significativamente el riesgo de meningococo.

**¿Quién debe vacunarse?** En general, los adolescentes de 11 a 18 años y los estudiantes universitarios que viven en dormitorios deben ser vacunados. Durante el brote, los funcionarios de salud pública han ampliado la recomendación de vacunación para incluir a las personas de 9 meses a 25 años que viven, trabajan o asisten a la escuela o guardería en Prineville mayor y se vacunan contra el meningococo.

**¿Dónde puedo vacunarme?** Si tiene cobertura de atención médica, ya sea un seguro privado o por medio del Plan de Salud de Oregón, debe llamar a su proveedor de atención médica o farmacéutico. En Prineville, las siguientes farmacias brindan la vacuna meningocócica: Bi-Mart, Clinic & Rite Aid.

**No tengo seguro ¿Todavía puedo recibir una vacuna?** Sí. Puede comprar una vacuna en farmacias o clínicas locales por aproximadamente \$ 160 - \$ 200. Si no puede comprar una vacuna, las personas sin seguro (o aquellas cuyo seguro no cubre la vacuna contra el meningococo) pueden recibir la vacuna en las clínicas sin cita previa los lunes en el Departamento de Salud del Condado de Crook, 375 NE Beaver St, Prineville entre Las horas de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y 1:00 p.m. a las 4:00 p.m. No se necesitan citas.

Los niños no asegurados, inscritos en Medicaid y los indios americanos / nativos de Alaska de 9 meses a 18 años de edad son elegibles para recibir la vacuna financiada con fondos federales a través del programa Vacunas para niños durante el brote.

**Mi hijo/a se vacunó contra el meningococo hace unos años. ¿Necesita otro?** Por lo general, los adolescentes reciben una vacuna de refuerzo aproximadamente cinco años después de la primera. Consulte con su proveedor de atención médica para ver si su hijo/a debe recibir un refuerzo.

**¿Puedo llevar a mi hijo/a a la farmacia para una vacuna contra el meningococo?** Sí, pero los niños menores de 11 años necesitan una receta médica para ser vacunados por un farmacéutico.

**Mi hijo/a está en un equipo deportivo que viene a Prineville. ¿Debo tenerlo en casa?** Los niños deben ser vacunados a la edad de 11 o 12 años, sin embargo, esta vacuna no es necesaria para la escuela. Verifique el registro de inmunización de su hijo/a o consulte a su proveedor de atención médica para asegurarse de que haya recibido su vacuna meningocócica.

**¿Cuáles son los riesgos de las vacunas contra el meningococo?**

Una vacuna, como otro medicamento, podría causar problemas graves, como reacciones alérgicas graves. El riesgo de que la vacuna meningocócica cause daños graves o la muerte es extremadamente bajo. Las reacciones leves comunes incluyen enrojecimiento o dolor en el lugar de la inyección. Un pequeño porcentaje de personas que reciben la vacuna desarrollan una fiebre leve.

Los signos de una reacción alérgica grave pueden incluir dificultad para respirar, debilidad, ronquera / sibilancias, latidos cardíacos acelerados, urticaria, mareos, palidez o hinchazón de la garganta. Si se presenta cualquiera de estos síntomas, llame a un médico de inmediato o acuda al médico de inmediato.